



## การประมาณเวลาการตายโดยอาศัยข้อมูล วงจรชีวิตของแมลงวันบนศพ

เผด็จ สิริยะเสถียร\*

นันทนา ศิริทรัพย์\*\*

**Siriyasatien P, Sirisup N. Estimation of post-mortem interval (PMI) using data from lifecycle of flies on corpses. Chula Med J 2005 Apr; 49(4): 195 - 200**

*Estimation of postmortem interval (PMI) of an individual is an important data for medicocriminal investigations. For estimating the early postmortem period, muscular and other physiological changes such as body cooling and mechanical excitability of skeleton muscle have been used. After 48-72 hours, forensic entomology is often the only method for estimating the PMI. Blow flies are recognized as the first wave of the faunal succession on human cadavers therefore they are the most accurate forensic indicator to estimate the PMI. Understanding the lifecycle and behavior of blow flies may assist forensic personnel to determine the PMI more accurately.*

**Keywords:** Postmortem interval, Blow files.

Reprint request : Siriyasatien P. Department of Parasitology, Faculty of Medicine,  
Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand.

Received for publication. January 20, 2005.

### วัตถุประสงค์:

1. เข้าใจวงจรชีวิตของแมลงวันที่มีความสำคัญทางนิติเวชศาสตร์
2. สามารถนำข้อมูลแมลงวันมาประยุกต์ใช้กับงานทางนิติเวชศาสตร์


\* ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

\*\* ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลที่สำคัญทางนิติเวชศาสตร์เกี่ยวกับการเสียชีวิตอย่างหนึ่งคือเวลาการตาย (Post-Mortem Interval, PMI) ในการชันสูตรพลิกศพที่ตายโดยผิดธรรมชาติ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 มาตรา 148 และ 154<sup>(1)</sup> บัญญัติไว้ว่า "ให้ผู้ชันสูตรพลิกศพทำความเห็นเป็นหนังสือ แสดง เหตุและพฤติการณ์ที่ตายผู้ตายเป็นใคร ตายที่ไหน เมื่อใด ถ้าตายโดยคนทำร้ายให้กล่าวหาใคร หรือสงสัยว่าใครเป็นผู้กระทำผิดเท่าที่จะทราบได้" วัตถุประสงค์ที่สำคัญหนึ่งของการชันสูตรพลิกศพที่กำหนดไว้ในกฎหมายก็คือ การระบุเวลาการตาย ดังนั้นการหาหลักฐานมาสนับสนุนเพื่อประมาณเวลาการตายจึงมีความสำคัญมากสำหรับแพทย์และบุคลากรทางนิติเวชสำหรับการประมาณเวลาการตายในระยะแรกนั้นสามารถใช้ข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของศพ เช่นการแข็งตัวของกล้ามเนื้อ อุณหภูมิของศพ การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของน้ำในลูกนัยน์ตา เป็นต้น แต่ในกรณีที่ศพเสียชีวิตมานานกว่า 48 ชั่วโมงแล้ว การอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของศพจะมีความแม่นยำน้อยลงเนื่องจากศพเน่า จึงมีความจำเป็นต้องหาหลักฐานอื่นมาสนับสนุน ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542<sup>(2)</sup> ที่มีความโดยสรุป ให้แพทย์มีหน้าที่ออกไปชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุแพทย์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสังเกตค้นหาพยานหลักฐานที่จะเป็นข้อสนับสนุนการวินิจฉัยเวลาการตาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่ศพเน่า ปัจจุบันความรู้ทางนิติกีฏวิทยา (Forensic Entomology) มีการพัฒนาไปอย่างมากและได้มีการนำมาประยุกต์ในการประมาณเวลาการตาย แมลงที่มีบทบาทมากในกรณีนี้คือแมลงวันหัวเขียว (Blow flies) ซึ่งมีนิสัยที่ชอบตอมสิ่งปฏิกูล รวมทั้งซากศพ แมลงวันหัวเขียวเป็นแมลงวันที่อาศัยใกล้ชิดและกับคน (synanthropic flies) ด้วยเหตุที่มันอาศัยใกล้ชิดกับคน ดังนั้นแมลงวันหัวเขียวจึงเป็นแมลงกลุ่มแรกที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับศพ และสามารถใช้เป็นดัชนีบ่งบอกเวลาการตายได้ใกล้เคียงมาก<sup>(3-7)</sup>


### วงจรชีวิตของแมลงวันหัวเขียว

การที่เราจะนำข้อมูลของแมลงวันมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและวงจรชีวิตของแมลงวันเป็นอย่างดี แมลงวันหัวเขียว (Blow flies) เป็นชื่อสามัญของแมลงวันที่มีลำตัวสีเขียวหรือน้ำเงิน ซึ่งมีอยู่หลายชนิด (species) ชนิดที่พบมากที่สุดในประเทศไทยคือ *Chrysomya megacephala*<sup>(8)</sup> ลักษณะโดยทั่วไปของแมลงวันหัวเขียวคือมีลำตัวค่อนข้างกลม ส่วนอกมีขนาดใหญ่ มีขนขนาดใหญ่ปกคลุมทั่วตัว ตาประกอบขนาดใหญ่ (รูปที่ 1) ตัวเต็มวัยมักอาศัยในบริเวณบ้านและตอมสิ่งปฏิกูลเป็นอาหาร ตัวเมียวางไข่เป็นกลุ่มประมาณ 50-100 ฟอง ประมาณ 12 ชั่วโมงไข่จึงฟักออกเป็นหนอนวัยที่ 1 (1<sup>st</sup> stage larva หรือ 1<sup>st</sup> instar larva) หนอนแมลงวันมักจะใช้คำเรียกเฉพาะว่า maggot ลักษณะของหนอนแมลงวันคือส่วนหัวมีขนาดเล็กมีอวัยวะที่ใช้กินอาหารเรียกว่า hook อยู่ 1 คู่ ส่วนท้ายของหนอนมีลักษณะป้านโดยมีท่อหายใจอยู่ 1 คู่เรียกว่า posterior spiracle (รูปที่ 2) รูปร่างลักษณะของ posterior spiracle นี้ใช้ช่วยในการจำแนกชนิดของหนอนแมลงวันได้ (รูปที่ 3) หนอนจะลอกคราบ 2 ครั้งเป็นหนอนวัยที่ 2 และ 3 ตามลำดับ หนอนวัยที่ 1 ใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมงเพื่อเจริญเป็นหนอนวัยที่ 2 และหนอนวัยที่ 2 ใช้เวลาประมาณ 12-24 ชั่วโมง เพื่อเจริญเป็นหนอนวัยที่ 3 เมื่อหนอนวัยที่ 3 โตเต็มที่ (peak feeding) มันจะหยุดกินอาหารและหาที่มืดและแห้งเพื่อเข้าสู่ระยะดักแด้ต่อไป หนอนวัยที่ 3 ใช้เวลาจนกระทั่งเป็นดักแด้ (pupa) ประมาณ 4-5 วัน ภายในดักแด้ตัวหนอนจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพื่อเป็นแมลงวัน




รูปที่ 1. รูปร่างลักษณะของแมลงวันหัวเขียว





รูปที่ 2. วงจรชีวิตของแมลงวัน



รูปที่ 3. Posterior spiracle ของหนอนแมลงวัน  
*Chrysomya megacephala*

ตัวเต็มวัยโดยใช้เวลาในดักแต่ประมาณ 5-7 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาที่ใช้ในการเจริญเติบโตของหนอนแต่ละระยะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณอาหาร ความหนาแน่นของหนอนแมลงวัน แต่ปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุดคืออุณหภูมิ<sup>(9)</sup>

การนำข้อมูลจากแมลงวันมาประมาณเวลาการตาย<sup>(10,11)</sup>

ในสภาวะที่เหมาะสมเช่นอุณหภูมิที่พอเหมาะ แมลงวันตัวเมียจะไปวางไข่บนศพภายใน 1 ชั่วโมงหลังการตาย โดยมันจะเลือกวางไข่บริเวณบาดแผลหรือบริเวณเยื่อตามช่องต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น โพงงจมูก ปาก

ลูกตา เป็นต้น เนื่องจากไข่และตัวหนอนที่ฟักจากไข่ต้องการความชื้น หนอนแมลงวันจะหลั่งน้ำลายซึ่งเป็นเอ็นไซม์ที่มีฤทธิ์ย่อยโปรตีน (proteolytic enzymes) ออกมาและเนื่องจากแมลงวันจะวางไข่ครั้งละมาก ๆ จึงเกิดเป็นหนอนจำนวนมาก ซึ่งทำให้ได้น้ำลายออกมาได้ปริมาณมาก น้ำลายที่หลั่งออกมาแบบนี้จะช่วยทำให้เนื้อเยื่อสลายตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น หนอนแมลงวันกินอาหารโดยอาศัย hook ซึ่งอยู่บริเวณส่วนหัว หนอนแมลงวันจะลอกคราบ 2 ครั้ง จึงเจริญเต็มที่ เมื่อหนอนวัยที่ 3 กินอาหารเต็มที่แล้วมันจะเคลื่อนย้ายออกจากศพไปหาที่ซึ่งแห้งและมีแดดเพื่อเข้าดักแด่เช่นในดินหรือใต้พรม เป็นต้น ภายในดักแด้นั้นหนอนจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเป็นแมลงวัน


การประมาณ PMI โดยอาศัยความยาวของหนอนแมลงวัน ซึ่งจะวัดจากตัวหนอนที่มีขนาดใหญ่และยาวที่สุด เนื่องจากมันมีอายุมากที่สุดแต่ทั้งนี้ต้องทำก่อนที่หนอนจะเข้าสู่ peak feeding เพราะหลังจากระยะนี้แล้ว หนอนจะไม่กินอาหารทำให้น้ำหนักและขนาดลำตัวไม่เพิ่มขึ้นแต่จะลดลงเพราะเป็นระยะที่เตรียมเข้าดักแด่ ดังนั้นเมื่อนำหนอนระยะที่ 3 มาประมาณค่า PMI จะต้องดูว่าหนอนเข้าสู่ระยะ peak feeding แล้วหรือไม่ เพราะอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการคะเน PMI โดยใช้ความ

ยาวของหนอนเป็นเกณฑ์ได้ นอกจากการเจริญเติบโตของ หนอนแมลงวันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างดังที่กล่าว มาข้างต้นแล้ว ปัจจัยที่มีความสำคัญมากคืออุณหภูมิ ดังนั้นการประมาณ PMI จะต้องมีข้อมูลของอุณหภูมิ มาประกอบ การที่มีฝนตกในช่วงของการตายจะมีผล ต่อปริมาณความชื้นและอุณหภูมิ ซึ่งจะต้องนำมาร่วม พิจารณาด้วยจากการศึกษาของ Grassenberger และ Reiter ถึงผลของอุณหภูมิต่อการเจริญของแมลงวันหัวเขียว *Protophormia terraenovae* ตั้งแต่เป็นไข่ ตัวหนอนและ ดักแด้ พบว่าอุณหภูมิมิผลต่อระยะเวลาที่ใช้ในการเจริญ ของแมลงวันทุกระยะ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาผลของอุณหภูมิตั้งที่ 15, 20, 25, 30 และ 35 องศาเซลเซียส แล้วนำมาเขียน กราฟโดย แนวนอนเป็นเวลาหลังจากฟักออกจากไข่ แนวตั้งเป็นความยาวของหนอน (รูปที่ 4)

ตำแหน่งสูงสุดของกราฟคือระยะ peak feeding และกราฟสิ้นสุดเมื่อแมลงวันเข้าสู่ระยะดักแด้ จากกราฟจะ พบว่าที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส หนอนแมลงวันใช้เวลา เจริญจนเป็นดักแด้นานที่สุด ส่วนที่อุณหภูมิตั้งขึ้นระยะ ระยะเวลาที่แมลงวันใช้ในการเจริญเติบโตรวมทั้งระยะเวลาที่ ฟักออกจากไข่จะสั้นลง หลังระยะ peak feeding แล้ว


ความยาวของหนอนแมลงวันลดลง ดังนั้นหากนำหนอน ระยะที่ 3 มาประมาณค่า PMI ต้องสังเกตว่าหนอนเข้าสู่ ระยะ peak feeding แล้วหรือไม่ประโยชน์ของกราฟนี้คือ เมื่อเราเก็บตัวอย่างหนอนแมลงวันจากศพมาวัดขนาดโดย มีข้อมูลของอุณหภูมิจดเฉลี่ยในที่เกิดเหตุมาประกอบแล้ว ลากเส้นลงมายังแกนเวลาเรา ก็สามารถประมาณวันที่ เสียชีวิตได้ อย่างไรก็ตามการใช้กราฟนี้ยังมีข้อจำกัดอยู่ เช่นอุณหภูมิซึ่งในสภาวะปกติจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอด เวลา ดังนั้นหากศพอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง ของอุณหภูมิมากเช่นในที่โล่ง การใช้กราฟนี้ประมาณระยะ เวลาการเสียชีวิตจะไม่แม่นยำเท่าที่ควร แต่หากศพอยู่ในที่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตั้งขึ้นในห้องหรือภายใน บ้านการใช้กราฟช่วยประมาณจะมีความแม่นยำมากขึ้น

นอกจากนี้ Grassberger และ Reiter ยังนำข้อมูล ที่ได้มาเขียนเป็นกราฟที่เรียกว่า Isomorphen-diagram (รูปที่ 5) โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิตั้ง และ ระยะเวลาที่ใช้ในการเจริญในแต่ละระยะของแมลงวัน ตั้งแต่ ไข่จนถึงเวลาฟักเป็นตัวหนอน (hatching) ระยะ ดักแด้ (pupariation) และระยะที่แมลงวันออกจากดักแด้ (adult emergence หรือ eclosion)



รูปที่ 4. กราฟแสดงผลของอุณหภูมิต่อขนาดของหนอนแมลงวัน *Protophormia terraenovae* และระยะเวลาที่ใช้ในการเจริญเติบโต (ดัดแปลงจาก Grassberger และ Reiter, 2002)






รูปที่ 5. Isomorphen-diagram แสดงผลของอุณหภูมิต่อระหว่างระยะเวลาที่ใช้ในการเจริญของแมลงวันในวัยต่างๆ (จาก Grassberger และ Reiter, 2002)

ประโยชน์ของ Isomorphen-diagram คือ สามารถนำมาใช้ในการประมาณระยะเวลาการเสียชีวิตโดยใช้ระยะของแมลงวันที่พบมาคำนวณย้อนกลับได้ สมมุติว่าเราเก็บดักแด้ของหนอนแมลงวันมาได้และอุณหภูมิในช่วงเวลานั้นเท่ากับ 30 องศาเซลเซียส และเมื่อนำดักแด้มาไว้ในห้องทดลองที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส อีก 2 วันแมลงวันจึงออกมาจากดักแด้ ดังนั้นเราสามารถประมาณระยะเวลาการ

เสียชีวิตโดยลากเส้นตรงจากที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ไปยังเส้น adult emergence แล้วลากเส้นตั้งฉากลงมาบรรจบกับเส้นแนวนอนซึ่งอยู่ที่ประมาณ 12 วัน (รูปที่ 6 เส้นที่มีลูกศร) แต่เนื่องจากเราต้องนำดักแด้มาเก็บไว้ในห้องทดลองอีก 2 วันจึงเป็นตัวเต็มวัย ดังนั้นระยะเวลาการเสียชีวิตจนถึงวันที่เราไปชันสูตรจึงเท่ากับ 10 วัน



รูปที่ 6. การประมาณระยะเวลาการเสียชีวิตจาก Isomorphen-diagram

## สรุป

การนำข้อมูลที่ได้จากแมลงวันมาเป็นตัวบ่งบอกเวลาการตาย นับว่ามีประโยชน์อย่างมากกล่าวคือมีความแม่นยำสูงและไม่มีความยุ่งยาก อย่างไรก็ตามมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการเจริญของแมลงวัน ซึ่งจะไม่มีผลต่อการประมาณค่า PMI เช่น อุณหภูมิ ความชื้นและที่สำคัญที่สุดคือประสบการณ์ของผู้ออกไปชันสูตรในการเก็บตัวอย่างแมลงวัน เพราะหากเก็บเพียงแต่หนอนจากศพโดยไม่ตรวจดูว่ามีแมลงวันที่เป็นดักแด้อยู่ตามพื้นหรือได้พอมแล้ว จะทำให้การประมาณค่า PMI ผิดพลาดไปมาก นอกจากนี้แมลงวันแต่ละชนิดใช้เวลาในการเจริญที่แตกต่างกัน กราฟที่นำมาเป็นตัวอ้างอิงซึ่งเป็นของแมลงวัน *Protophormia terraenovae* เป็นแมลงวันหัวเขียวที่พบในเขตหนาวแต่เนื่องจากแมลงวันแต่ละชนิดจะมีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน ดังนั้นข้อมูลของแมลงวัน *Protophormia terraenovae* จึงไม่สามารถนำมาใช้กับแมลงวันหัวเขียวในประเทศไทยได้ ดังนั้นการประมาณระยะเวลาการเสียชีวิตโดยใช้แมลงวันจึงต้องใช้ข้อมูลที่ตรงกับแมลงวันชนิดนั้น ๆ จึงจะได้ค่า PMI ที่ใกล้เคียงที่สุด

## อ้างอิง

1. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477.
2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542
3. Greenberg B. Flies as forensic indicators. J Med Entomol 1991 Sep; 28(5): 565 - 77
4. Catts EP, Goff ML. Forensic entomology in criminal investigations. Annu Rev Entomol 1992;37: 253 - 72
5. Introna F Jr, Campobasso CP, Di Fazio A. Three case studies in forensic entomology from Southern Italy. J Forensic Sci 1998 Jan; 43(1): 210 - 4
6. Benecke M. Six forensic entomology cases: description and commentary, J Forensic Sci 1998 Jul; 43(4): 797-805, 1303.
7. Turchetto M, Lafisca S, Costantini G. Postmortem interval (PMI) determined by study sarcophagous biocenoses: three cases from the province of Venice (Italy), For Sci Int 2001 Aug 15;120(1-2): 28 - 31
8. Sucharit S, Tumrasvin V, The survey of flies of medical and veterinary importance in Thailand. Jap J Sant Zool 1981; 32: 281 - 5
9. Wells JD, Kurahashi H, *Chrysomya megacephala* (Fabricius) (Diptera: Calliphoridae) development: rate, variation and the implications for forensic entomology. Jpn J Sanit Zool 1994; 45(2):303 - 9
10. Grassberger M, Reiter C. Effect of temperature on *Lucilia sericata* (Diptera: Calliphoridae) development with special reference to the isomegalen- and isomorphen-diagram. Forensic Sci Int 2001 Aug 15;120(1-2): 32 - 6
11. Grassberger M, Reiter C. Effect of temperature on development of the forensically important holarctic blow fly *Protophormia terraenovae* (Robineau-Desvoidy) (Diptera: Calliphoridae). Forensic Sci Int 2002 Aug 28; 128(3): 177 - 82

## กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแพทย์

ท่านสามารถได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการสำหรับกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแพทย์ กลุ่มที่ 3 ประเภทที่ 23 (ศึกษาด้วยตนเอง) โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์แห่งประเทศไทย (ศนพ.) จากการอ่านบทความเรื่อง "การประมาณเวลาการตายโดยอาศัยข้อมูลวงจรชีวิตของแมลงวันบนศพ" โดยตอบคำถามข้างล่างนี้ที่ท่านคิดว่าถูกต้องโดยใช้แบบฟอร์มคำตอบท้ายคำถาม โดยสามารถตรวจจำนวนเครดิตได้จาก <http://www.ccme.or.th>

### คำถาม - คำตอบ

1. แมลงวันที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการประมาณเวลาตายคือ
  - ก. แมลงวันบ้าน
  - ข. แมลงวันหลังลาย
  - ค. แมลงวันหัวเขียว
  - ง. แมลงวันคอก
  - จ. แมลงวันหัวเหลือง
2. ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเจริญของหนอนแมลงวันคือ
  - ก. ความชื้น
  - ข. ความหนาแน่นของหนอนแมลงวัน
  - ค. ปริมาณน้ำฝน
  - ง. อุณหภูมิ
  - จ. แสง
3. เหตุผลสำคัญที่แมลงวันสามารถนำมาใช้เป็นดัชนีที่แสดงถึงค่า PMI คือ
  - ก. เป็น Synanthropic
  - ข. มีวงจรชีวิตสั้น
  - ค. เจริญได้ดีในสภาพที่เป็นกรด
  - ง. บินได้ไกล
  - จ. มีอวัยวะรับกลิ่นที่ดี

คำตอบ สำหรับบทความเรื่อง "การประมาณเวลาการตายโดยอาศัยข้อมูลวงจรชีวิตของแมลงวันบนศพ"  
จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 49 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2548  
รหัสสื่อการศึกษาต่อเนื่อง 3-23-201-9010/0504-(1006)

ชื่อ - นามสกุลผู้ขอ CME credit ..... เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม.....  
ที่อยู่.....

1. (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)
2. (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)
3. (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)

4. (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)
5. (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)

4. สมมุติว่าท่านไปชันสูตรศพซึ่งเสียชีวิตภายในห้องนอน อุณหภูมิในห้อง 20 องศาเซลเซียส ท่านเก็บหนองแมลงวันจากศพพบว่าเป็นหนองแมลงวัน *Protophormia terraenovae* และเมื่อนำมาวัดขนาดความยาวได้เท่ากับ 8 มิลลิเมตร ท่านประมาณ PMI ได้เท่ากับกี่วัน
- 3 วัน
  - 4 วัน
  - 5 วัน
  - 6 วัน
  - 7 วัน
5. สมมุติว่าท่านไปชันสูตรศพซึ่งเสียชีวิตภายในห้องนอน อุณหภูมิในห้อง 25 องศาเซลเซียส ท่านเก็บหนองแมลงวันจากศพพบว่าเป็นหนองแมลงวัน *Protophormia terraenovae* และนำมาเลี้ยงต่อในห้องทดลองที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส อีก 4 วันจึงเข้าสู่ระยะดักแด้ ท่านประมาณ PMI ได้เท่ากับกี่วัน
- 2 วัน
  - 5 วัน
  - 7 วัน
  - 10 วัน
  - 12 วัน

เฉลย สำหรับบทความ รหัสสื่อการศึกษาต่อเนื่อง 3-23-201-9010/0503-(1004)

1. ค 2. ค 3. ง 4. ก 5. ง

สำหรับบทความ รหัสสื่อการศึกษาต่อเนื่อง 3-23-201-9010/0503-(1005)

1. ง 2. จ 3. ข 4. ง 5. ค

สถาบันวิทยบริการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านที่ประสงค์จะได้รับเครดิตการศึกษาต่อเนื่อง (CME credit)  
กรุณาส่งคำตอบพร้อมรายละเอียดของท่านตามแบบฟอร์มด้านหน้า

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  
ประธานคณะกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง  
ตึกอำนวยการ ชั้น 5  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เขตปทุมวัน กทม. 10330